

TÉMA : **INFEKČNÁ METRITÍDA KONÍ**

- vysoko prenosná pohlavná choroba = sterilita
- **pôvodca baktéria** **Taylorella equigenitalis** = zápal sliznice maternice, krčku, vagíny + výtoky z pošvy
- choroba môže postihnúť buď kobyly alebo žrebca, ale je to kobyly, ktorá trpí na škodlivé účinky nákazy. Žrebce nevykazujú žiadne príznaky infekčnej metritídy koní, ale kobyly majú často bude mať silný výtok z reprodukčných orgánov
- najčastejšou vstupnou bránou infekcie = prirodzená plemenitba. Iný spôsob = umelá inseminácia, infekcia pri pôrode, vaginálne vyšetrenie kobýl, hygiena pôrodu.
- infikovaná kobyly = žrebec : prenos na ďalšie kobyly
- pred začiatkom pripúšťacej sezóny = bakteriologicky vyšetriť, bez neho by nemala vstupovať do plemenitby
- **varovný signál** = nepravidelnosť pohlavného cyklu + hlienovitý, šedý až žltý výtok, lepí v okolí vulvy, vnútornej strane stehien.
- klinický obraz nie je špecifický = **14 – 28 hodín** po zapustení objaviť šedý , zakalený výtok, symptómy trvajú **11 – 28 dní**. Klinické príznaky môžu zmiznúť v priebehu **14 – 42 hodín**
- **riziko** = prechod do chronickej formy, strata schopnosti endometria = zahniezdenie embrya + výživa : **STERILITA**
- **a/** špecifické vplyvy = **nedostatočná obranyschopnosť pohlavnej sústavy kobýl** = samočistenie : kontrakcia maternicovej svaloviny – vypudenie nežiaduceho obsahu von. Staršie kobyly = viac pôrodov
- **b/ nedostatočné uvoľnenie maternicového krčku / mladé kobyly /** = nežiaduci obsah maternice nemôže byť vylúčený = šírenie zápalu : sekrét maternicovej sliznice toxický - potrat
- **diagnóza** = ster z maternicového krčku, výplach maternicového obsahu
- **prevencia** laboratórne vyšetrenie vaginálneho steru
- **liečba** = antibiotiká + výplachy maternice, v niektorých prípadoch = podporná hormonálna liečba
- **ochranná lehota** = zákaz plemenitby cudzích kobýl, v závažných prípadoch = celková karanténa
- **poplatok** = 17 €

